

Prevence krvácivé nemoci

Prevence krvácení u novorozenců, způsobené nedostatkem vitamínu K, je součástí běžné péče o novorozence. Nedostatek vitamínu K je způsoben nedostatečným přenosem od matky přes placentu k plodu a jeho nedostatečnou tvorbou v prvních týdnech života dítěte.

Prevence krvácivé nemoci novorozenců spočívá v podání vitamínu dítěti aplikací injekce do svalu nebo podáním ústy.

Na našem oddělení se maminky donošených novorozenců mohou rozhodnout, jakou formu podání u dítěte upřednostní.

Vitamín K aplikovaný do svalu

- Dítěti je aplikován vitamín injekcí do stehna za přítomnosti maminky.
- Aplikace je provedena při první očistě novorozence v období 2 – 6 hodin po porodu.
- Injekce je jednorázová, podání vitamínu K se nemusí v dalších dnech opakovat.
- Děťátko může pocítit krátkou bolest.
- Aplikace je bezpečná i u dětí, které by mohly trpět malabsorpcí (poruchou vstřebávání ve střevě).

Vitamín K aplikovaný ústy

- Dítěti je podán vitamín formou kapek.
- Kapky jsou podány v období 2 – 6 hodin po porodu.
- V podání kapek je nutné pokračovat 1 x týdně do 12 týdnů věku dítěte. S praktickým lékařem pro děti a dorost se domluvíte, zda budete za účelem podání vitamínu K docházet do ordinace nebo zda jej budete podávat dítěti doma sami.
- Při podání kapek nepocituje dítě bolest, jako je tomu u injekčního podání.
- Účinnost se snižuje, jestliže by dítě trpělo malabsorpcí (poruchou vstřebávání ve střevě) nebo opakovaně zvrací.

